


УТВЕРЖДАЮ

Директор
Колледжа туризма и прикладных
технологий Санкт-Петербурга
С. А. Антонова



ИНСТРУКЦИЯ № 28 по применению дезинфицирующего средства – кожного антисептика (ИБ № 28)

1. **Дезинфицирующее средство** – кожный антисептик представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости, с запахом применяемой отдушки.

2. Дезинфицирующее средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ), патогенных грибов (в том числе возбудителей дерматофитий и кандидозов).

3. Гигиеническая обработка рук: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до полного высыхания (20-30 сек.), обращая особое внимание на тщательность обработки околоногтевых лож и межпальцевых участков.

4. Алгоритм, которого следует придерживаться, нанося и распределяя антисептик по поверхности кожи рук:

- сначала необходимо растереть одну ладонь о другую, захватывая запястья;
- далее необходимо приступить к обрабатыванию тыльных сторон кистей рук;
- потом следует растереть каждый палец по отдельности;
- затем большой палец и пространство между пальцами, а так же область верхней фаланги с ногтем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6. Использовать только для наружного применения в соответствии со способами применения. Не принимать внутрь!

7. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

8. Избегать попадания средства в глаза.

9. Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. При обработке не курить. Не допускать контакта с окислителями.

10. По истечении срока годности использование средства запрещается.

11. Хранить средство следует в темном, прохладном месте, недоступном детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств.

12. Дезинфицирующее средство должно применяться непосредственно из оригинальной упаковки изготовителя.

13. Разбавление средства водой или другими растворителями, а также смешивание средства с другими препаратами не допускается.

14. При случайной утечке больших количеств средства засыпать его негорючим адсорбирующим материалом (песком, силикагелем и пр.), после чего собрать в емкость для последующей утилизации. Остатки средства смыть с поверхностей большим количеством воды. В случае массивного разлива при уборке использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В; глаз - герметичные очки.

15. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, затем закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

16. При случайном попадании средства в желудок, рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу.

Инструкцию разработал

Специалист по охране труда

Ю.В. Мазилкин